

()

: , ,

产

A	5 ml	50 ml	250 ml
B	5 ml	50 ml	250 ml

产

Substrate ECL Ki 于 (Western Blotting) 中 (HRP) 体。
(ECL) HRP ,
中 低 价 。 ECL 、 体

产

1. : ;
2. : PVDF 上 ;
3. : 件优 下, 6 8 ;
4. : 作 24 ;
5. 价 : 优 , 于 低 体
0.2-1.0 g/mL — (1 mg/mL 1:1,000-1:5,000)
10-50 ng/mL 二 (1 mg/mL 1:20,000-1:100,000)

件

4 , 于 。

使

1. SDS-PAGE 、 Western Blotting , 0.2-1.0 g/mL —
1 h , , 10-50 ng/mL 二 30-60 min。

2. Western Blotting 一 作 : 体 A B ,
中 , 。 : 使 作 , 仍 使
但 低。
3. , 上 但 使 。 作 (0.1
mL 作 /cm²) 中, 与 作 。 3-5 min。
4. , 作 , 体。 两 中 ,
仪 。
5. : 于 , 上。 1 min, ,
。 30 、 1 min、 3 min、 5 min, 一
。 仪 : 仪 , 仪 书 。

事

1. 1~4 下 作, 但 于 下 久 低,
作 之。 以 上 下 。
2. , 使 , 不
。
3. 作 3 min 上 。 中 , 低丰
不 但 使 X 。 不 以
。 不 上 使 X ,
1-10 h。 不佳, , 二 , ECL
。

()			
)			
上	体 中	HRP	— HRP
于 8 h			

	体	中	HRP	,	—	HRP
	体 不		体			
	低		优			
	体	中	HRP	—	HRP	
	不		优		件	
	不		—			
	不		、			
			体			
			低			
	体		低		体	
	低		优			
	不					
	之					

仅供 使 。